

ハーボニー配合錠

【この薬は？】

販売名	ハーボニー配合錠 HARVONI Combination Tablets	
一般名	レジパスビル アセトン付加物 Ledipasvir Acetate	ソホスブビル Sofosbuvir
含有量 (1錠中)	レジパスビル 90mg	ソホスブビル 400mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・ この薬に含まれるレジパスビル及びソホスブビルは、いずれもC型肝炎ウイルス（HCV）の複製に必要なタンパク質を阻害して、抗ウイルス作用を示します。
- ・ 次の病気の人に処方されます。
セログループ1（ジェノタイプ1）又はセログループ2（ジェノタイプ2）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
- ・ この薬は、体調がよくなったと自己判断で使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化したり、薬が効きにくくなるおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・ 過去にハーボニー配合錠に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・ 腎臓に重度の障害がある人、透析を必要とする腎不全の人
 - ・ 次の薬を使用している人
カルバマゼピン（テグレトール）、フェニトイン（アレビアチン）、リファンピシン（リファジン）
 - ・ 次の食品を摂取している人
セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品
- この薬の使用に際しては、HCV RNA(C型肝炎ウイルスの遺伝子)陽性であることが確認されます。また、症状などから非代償性肝硬変でないことが確認されます。
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・ 高齢の人
 - ・ B型肝炎ウイルスに感染している人、過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある人
- この薬には併用をしてはいけない薬 [カルバマゼピン（テグレトール）、フェニトイン（アレビアチン）、リファンピシン（リファジン）] があります。また、アミオダロン（アンカロン）などの可能な限り併用を避けるべき薬や、併用に注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用前にアミオダロン（アンカロン）を使用していた場合には医師または薬剤師に相談してください。
- この薬を使用する前に B 型肝炎ウイルス感染の有無を確認する検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

1 回量	1 錠
飲む回数	1 日 1 回
飲む期間	1 2 週間

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬とアミオダロンとの併用により、徐脈などの不整脈があらわれるおそ

れがあり、海外において死亡例も報告されています。特に、 β （ベータ）遮断剤と呼ばれる薬を使用している人、心臓に疾患のある人、重度の肝臓疾患のある人では、アミオダロンとの併用により徐脈などの不整脈の発現の危険性が増加するおそれがあります。

- ・ アミオダロンとの併用は可能な限り避けられますが、やむを得ず併用する場合は、併用開始前に徐脈などの重篤な不整脈が発現する危険性があることについて十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・ 不整脈の徴候または症状（失神寸前の状態または失神、めまい、ふらつき、倦怠感（けんたいかん）、脱力、極度の疲労感、息切れ、胸の痛み、錯乱、記憶障害など）が認められた場合には、速やかに担当医師に連絡してください
- ・ アミオダロンとの併用開始から少なくとも3日間は入院し、心電図モニタリングが実施されます。退院後少なくとも2週間は、心拍数を毎日確認し、不整脈の徴候の発現などに注意してください。
- ・ B型肝炎ウイルスに感染している人や過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある人がこの薬を使用した場合に、C型肝炎ウイルス量が低下する一方、B型肝炎ウイルスが再活性化したとの報告があります。このため、B型肝炎ウイルスマーカーの検査が行われます。B型肝炎ウイルスの再活性化が起こっていると思える症状（発熱、からだがだるい、皮膚や白眼が黄色くなる、食欲不振など）があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳中の方は授乳を中止してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。




重大な副作用	主な自覚症状
高血圧 こうけつあつ	めまい、頭が重く痛い、肩こり
脳血管障害 のうけつかんしょうがい	めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、頭痛、嘔吐、半身まひ、しゃべりにくい、判断力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
頭部	めまい、頭痛、頭が重く痛い、意識がうすれる、考えがまとまらない
口や喉	嘔吐

部位	自覚症状
背中	肩こり
手・足	半身まひ
その他	しゃべりにくい、判断力の低下

【この薬の形は？】

形状	<p>ひし形のフィルムコーティング錠</p> 
包装	<p>PTP 包装</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>表面</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>裏面</p> </div> </div>
長径	20mm
短径	10mm
厚さ	6.6mm
重さ	1030mg
色	だいたい色
識別コード	GSI・7985

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レジパスビル、ソホスブビル
添加物	結晶セルロース、乳糖水和物、コポリビドン、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール4000、タルク、黄色5号アルミニウムレーキ

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・ 室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ギリアド・サイエンシズ株式会社 (<http://www.gilead.co.jp/>)

メディカルサポートセンター

電話：0120-506-295

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日及び会社休日を除く）